



Agroenzymas®

“Potencializador fisiológico”

Descripción:

Nutriactivador con base en Magnesio, Hierro, Zinc y la **tecnología ReactMAX**, que de forma conjunta estimulan el crecimiento y desarrollo adecuado de la planta y el rendimiento.

Principales Beneficios:

Potencializa componentes del rendimiento como brotación y diferenciación.

Incrementa calidad y cantidad de las cosechas.

Incrementa la funcionalidad del follaje.



Agroplex-TRIPLE

CON TECNOLOGÍA **ReactMAX**

ReactMAX

Adiciona la acción de compuestos estimulantes de crecimiento y cofactores que aseguran la efectividad de las fitohormonas.

Mecanismo de acción:

La tecnología React Max activa los receptores que tienen que ver con la inducción y diferenciación floral lo que potencializa el rendimiento.

CULTIVO	DOSIS L/ha	EPOCA DE APLICACIÓN
 Arroz	1.5-2.0	Para estimular la ganancia en biomasa del órgano de interés realice aplicaciones en periodos críticos de desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Inicie aplicaciones sobre crecimiento vegetativo, una vez iniciado el amacollamiento. • Repita al momento de diferenciación del primordio floral. • Repita al 40% de la espiga expuesta. En condiciones de carencia de Magnesio, Hierro y Zinc realice aplicaciones cada 15-20 días sobre el desarrollo del cultivo.
 Café	1.5-2.0	Para estimular la ganancia en biomasa del órgano de interés realice aplicaciones en periodos críticos de desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Primera aplicación a los 15 días antes de la floración, una vez establecidas las lluvias. • Repita al momento del secado de pétalos. Para estimular el crecimiento vegetativo y brotación lateral: <ul style="list-style-type: none"> • Aplique una vez que este inicia la brotación de forma posterior a la poda.
 Maíz	1.0-2.0	Para estimular la ganancia en biomasa del órgano de interés realice aplicaciones en periodos críticos de desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Primera aplicación sobre la etapa V4. • Repita antes de la etapa V6. En condiciones de carencia de Magnesio, Hierro y Zinc realice aplicaciones cada 15-20 días sobre el desarrollo del cultivo.
 Caña de azúcar	1.5-2.0	Para estimular la ganancia en biomasa del órgano de interés realice aplicaciones en periodos críticos de desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Primera aplicación a la corona ya sea en soca o resoca. • Repita iniciado el desarrollo vegetativo.
 Aguacate	2.0-4.0 (200 ml / 100 L de agua de aspersión)	Para estimular la ganancia en biomasa del órgano de interés realice aplicaciones en periodos críticos de desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Primera aplicación de sobre la formación de la inflorescencia. • Segunda aplicación sobre floración, buscando cubrir el mayor porcentaje de estas. • Tercera aplicación sobre fruto en tamaño cabeza de cerillo. Maneje dosis acorde a la edad y porte del árbol.
 Piña	2.0-4.0 (200 ml / 100 L de agua de aspersión)	Para estimular la ganancia en biomasa del órgano de interés realice aplicaciones en periodos críticos de desarrollo: <ul style="list-style-type: none"> • Primera aplicación una vez que el último tercio de flores dentro de la sorosis este abierta. • Segunda 30 días después de la primera.
 Tomate	1.5-2.0	Para estimular la ganancia en biomasa del órgano de interés realice aplicaciones sobre floración y frutos pequeños cada 15 días.

Diferenciadores:

-  Contiene elementos quelatados
-  Contiene compuestos estimulantes y cofactores
-  Componentes altamente asimilables.
-  Auxilia el amarre de fruto



Momento ideal de aplicación:

Sobre órganos jóvenes: para estimular el crecimiento

Cereales: en hojas 4-6 con los insecticidas (con los insecticidas)

Frutas: a inicios de floración y sobre frutos pequeños

